

Qui devrait recevoir le vaccin?

Vaccin conjugué contre le pneumocoque

Le Comité consultatif national de l'immunisation recommande le vaccin conjugué contre le pneumocoque aux personnes suivantes :

1) Tous les enfants de ≤ 23 mois

2) Les enfants de 24 à 59 mois qui présentent un risque plus élevé de pneumocoques invasives, soit :

- Les enfants qui fréquentent une garderie
- Les enfants autochtones
- Les enfants qui ont une hémoglobinose ou autre maladie drépanocytaire
- Les enfants qui ont une asplénie fonctionnelle ou anatomique
- Les enfants qui ont une infection à VIH
- Les enfants qui ont une maladie immunodéprimante (p. ex., immunodéficits primaires; tumeurs malignes; états résultant d'une thérapie immunosuppressive, de la transplantation d'un organe plein ou de l'utilisation prolongée de corticostéroïdes systémiques; syndrome néphrotique)
- Les enfants qui ont un trouble médical chronique (p. ex., maladie cardiaque ou pulmonaire chronique comme la dysplasie bronchopulmonaire; diabète sucré; maladie rénale chronique ou écoulement chronique de liquide céphalorachidien)
- Les enfants qui portent ou qui vont recevoir un implant cochléaire

3) Autres

- Les autres enfants dans ces groupes d'âge devraient être encouragés à recevoir le vaccin même s'ils ne font pas partie des catégories ci-dessus

Contre-indications et précautions

N'administrez **PAS** le vaccin conjugué contre le pneumocoque :

- aux enfants qui ont présenté une réaction anaphylactique à une dose antérieure

Posologie

La dose du vaccin conjugué est de 0,5 mL pour tous les groupes d'âge.

On trouvera les calendriers de vaccination selon l'âge dans le Guide canadien d'immunisation :

<http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/p04-pneu-fra.php>

Effets secondaires

- Fièvre
- On observe parfois un érythème, un œdème et une sensibilité au point d'injection

Référence

Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI)

www.phac-aspc.gc.ca/naci-ccni/index-fra.php

Pour en savoir plus

La Coalition canadienne pour la sensibilisation et la promotion de la vaccination
immunize.ca

août 2010

Pour le vaccin polysaccharidique contre le pneumocoque, voir au verso

Qui devrait
recevoir le vaccin?

Vaccin polysaccharidique contre le pneumocoque

Le Comité consultatif national de l'immunisation recommande le vaccin polysaccharidique contre le pneumocoque aux personnes suivantes :

- 1) **Toute personne de ≥ 65 ans**
- 2) **Toute personne de > 5 ans qui n'a pas déjà reçu le vaccin et qui présente un risque plus élevé de pneumocoques invasives, dont les personnes :**
 - qui fréquentent une garderie
 - qui sont autochtones
 - qui ont une hémoglobinose ou autre maladie drépanocytaire
 - qui ont une asplénie fonctionnelle ou anatomique
 - qui ont une infection à VIH
 - qui ont une maladie immunodéprimante (p. ex., immunodéficits primaires; tumeurs malignes; états résultant d'une thérapie immunosuppressive, de la transplantation d'un organe plein ou de l'utilisation prolongée de corticostéroïdes systémiques; syndrome néphrotique)
 - qui ont un trouble médical chronique (p. ex., maladie cardiaque ou pulmonaire chronique comme la dysplasie bronchopulmonaire; diabète sucré; maladie rénale chronique, cirrhose ou écoulement chronique de liquide céphalorachidien), ainsi que les personnes :
 - qui sont alcooliques
 - qui portent ou qui vont recevoir un implant cochléaire
 - qui fument

Contre-indications et précautions

N'administrez **PAS** le vaccin polysaccharidique contre le pneumocoque :

- aux personnes qui ont présenté une réaction anaphylactique à une dose antérieure

Posologie

La dose du vaccin polysaccharidique est de 0,5 mL pour tous les groupes d'âge.

Effets secondaires

- On observe assez souvent une sensibilité et un érythème au point d'injection
- On observe parfois une légère fièvre
- On observe très rarement des effets secondaires modérés à graves

Autres considérations et conseils

- Le vaccin contre le pneumocoque peut être administré en même temps que le vaccin contre l'influenza, sur l'autre bras
- La pneumonie à pneumocoque est une complication de l'influenza
- Le vaccin contre le pneumocoque peut être administré toute l'année
- La plupart des gens n'ont besoin que d'une dose du vaccin polysaccharidique contre le pneumocoque au cours de leur vie; pour l'immunisation des sujets immunodéprimés, consultez le Guide canadien d'immunisation : <http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/p03-07-fra.php>

Référence

Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI)
www.phac-aspc.gc.ca/naci-ccni/index-fra.php

Pour en savoir plus

La Coalition canadienne pour la sensibilisation et la promotion de la vaccination
immunize.ca

août 2010

Pour le vaccin conjugué contre le pneumocoque, voir au recto