

L'ADMINISTRATION DU VACCIN dcaT PENDANT LA GROSSESSE : GUIDE DE POCHE À L'INTENTION DES VACCINATEURS

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande la vaccination par le vaccin dcaT aux personnes suivantes :

- toutes les femmes enceintes au cours de chaque grossesse, quels que soient les antécédents de vaccination ou l'intervalle entre les grossesses.

Calendrier et posologie

Chaque dose du vaccin dcaT est de 0,5 mL.

1. Toutes les femmes enceintes au cours de chaque grossesse

- Administrer une dose du vaccin dcaT entre les 27^e et 32^e semaines de grossesse

2. Les femmes enceintes qui sont à risque accru d'accouchement prématuré

- Administrer une dose du vaccin dcaT entre les 13^e et 16^e semaines de grossesse

Revaccination

Si l'immunisation par le vaccin dcaT a été assurée au début de la grossesse, il ne sera pas nécessaire de renouveler l'immunisation après 13 semaines de grossesse.

Contre-indications et précautions

Les vaccins dcaT sont contre-indiqués chez les personnes ayant des antécédents d'anaphylaxie survenus après une administration antérieure du vaccin dcaT, et chez les personnes qui ont eu des réactions d'hypersensibilité immédiate ou anaphylactique à l'un des composants du vaccin ou à l'un des éléments du contenant.

Effets secondaires

- Douleur ou rougeur au point de l'injection.
- Une légère fièvre est possible.
- Rarement, des réactions modérées à sévères peuvent survenir.

Administration simultanée avec d'autres vaccins

On peut administrer les vaccins dcaT en même temps que d'autres vaccins systématiques – mais il faut utiliser un point d'injection différent ainsi qu'une aiguille et une seringue distinctes.

Pour plus d'information, visiter le site Web du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) à <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni.html>