

## Qu'est-ce que les oreillons?

Les oreillons sont une infection virale contagieuse causée par le virus des oreillons. Le symptôme le plus courant des oreillons est l'enflure des glandes salivaires. Quand elles deviennent enflammées, elles peuvent gonfler et causer une sensibilité à la palpation de la mâchoire et de la douleur en mangeant. Dans de rares cas, l'infection par les oreillons peut entraîner une méningite, une surdité ou des infections des testicules ou des ovaires.

## Comment se transmettent les oreillons?

Le virus des oreillons entre dans l'organisme par le nez ou la bouche. Les oreillons se propagent par les contacts étroits avec d'autres (p. ex. en toussant ou en éternuant près de quelqu'un ou en partageant des articles personnels comme des boissons) ou par contact direct avec le mucus ou la salive d'une personne infectée, puis l'entrée de ces fluides dans le nez ou la bouche.

## La vaccination est recommandée pour tout le monde.

La vaccination contre les oreillons fait partie du calendrier vaccinal de routine de l'enfance au Canada. Le vaccin RRO protège contre la rougeole, les oreillons et la rubéole; le vaccin RRVO protège contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle.

## La vaccination contre les oreillons est sûre et efficace.

Les programmes d'immunisation subventionnés par l'État peuvent varier selon la province ou le territoire.



**Parlez à votre médecin, votre infirmière ou infirmier, votre pharmacien ou pharmacienne ou votre bureau local de santé publique pour vous faire vacciner, vous ou votre enfant, contre les oreillons.**